

пробанда. Более точные данные по генеалогии отслеживались позже, когда проявлялось большинство признаков ДСТ у пробанда – в возрасте 12-14 лет.

Таблица 8

Прогностическое значение факторов риска дисплазий соединительной ткани

Факторы риска	Информативность по Кульбаку
Дифференцированные соединительно-тканые синдромы у родственников 1 и 2 степени родства	4,01
Ортопедическая патология у родственников 1 и 2 степени родства	3,11
Раннее отхождение околоплодных вод	1,47
Инфекционные заболевания (в том числе вирусы гепатита, цитомегаловирус, герпес)	1,28
Многоплодная беременность	1,24
Масса тела новорожденного менее 2800 г	0,74
Угроза невынашивания	0,53
Осложнения в процессе родов (длительность родового акта и безводного периода)	0,46
Пожилой возраст родителей (после 40 лет)	0,44
Неправильное положение плода	0,39
Недоношенность	0,38
Профессиональные вредности (химические и физические)	0,36
Отягощенный акушерский анамнез матери	0,30
Операция кесарево сечение	0,28
Избыточная длина пуповины	0,14
Хронические заболевания у матери	0,12
Самопроизвольные аборты, мертворождения в прошлом	0,12
Чрезмерно юный возраст родителей (до 18 лет)	0,11
Ранний и/или поздний токсикозы	0,11
Переношенность	0,11
Вредные привычки матери (курение)	0,05
Ручное пособие в родах	0,04

Из семейного и акушерского анамнеза следует анализировать следующие факторы риска ДСТ:

- установленные дифференцированные синдромы у родственников (синдром Марфана, Элерса–Данло, несовершенного остеогенеза, cutis laxa) или другие соединительнотканые синдромы