

Таблица 9

Частота и информативность диспластических изменений скелета и внутренних органов, выявленных у детей дошкольного возраста

Признаки ДСТ	Частота признаков ДСТ у детей (n=80)	Информативность по Кульбаку
Гипермобильность суставов 7–9 баллов по Beighton и Horan	50.0% (n=40)	4.5
Долихостеномелия	37.5% (n=15)	4.12
Кифосколиоз позвоночника	1.25% (n=1)	3.49
Дисплазия тазобедренных суставов	8.75% (n=7)	2.23
Арахнодактилия	18.75% (n=15)	2.06
Сглаженность физиологических изгибов позвоночника — «прямая спина»	16.25% (n=13)	1.67
Брахидактилия	16.25% (n=13)	1.67
Воронкообразная деформация грудной клетки	15.0% (n=12)	1.48
Аномально расположенные хорды левого желудочка	30.0% (n=24)	1.45
Сколиоз позвоночника	5.0% (n=4)	1.19
Плоскостопие продольное	5.0% (n=4)	1.19
Снижение массо-ростового показателя: индекс Варги ≤ 1.7	11.25% (n=9)	0.95
X- и O-образное искривление ног	3.75% (n=3)	0.84
Плоско-вальгусная деформация стоп	3.75 % (n=3)	0.84
Пролапс митрального клапана	3.75% (n=3)	0.84
Короткая уздечка языка	10.0%(n=8)	0.79
Косолапость	2.5% (n=2)	0.52
Миопия	2.5% (n=2)	0.52
Неравномерное развитие створок аортального клапана	2.5% (n=2)	0.52
Фимоз, парафимоз	2.5% (n=2)	0.52
Добавочные шейные ребра	1.25% (n=1)	0.22
Астигматизм	1.25% (n=1)	0.22
Пролапс митрального клапана с миксоматозно изменёнными створками	1.25% (n=1)	0.22
Килевидная деформация грудной клетки	3.75% (n=3)	0.12
Расширение пупочного кольца	3.75% (n=3)	0.12
Пупочная грыжа	3.75% (n=3)	0.12