

Частота встречаемости признаков дисплазии соединительной ткани у подростков

Признаки дисплазии соединительной ткани	Частота признаков ДСТ, %	Частота в зависимости от конституции, %	
		Нормостенический тип конституции (n=453)	Астенический тип конституции (n=402)
Мобильность суставов 0-3 баллов	72,0	78,6	65,4
Гипермобильность суставов 4-6 баллов	21,8	18,3	28,2*
Гипермобильность суставов 7-9 баллов	4,8	3,1	6,4
Воронкообразная деформация грудной клетки 1-2 степени	5,7	5,9	5,4
Плосковороночная деформация грудной клетки	18,0	12,2	23,8*
Килевидная деформация грудной клетки, корпорокостальный тип	8,3	5,2	11,4*
Килевидная деформация грудной клетки, манубриостеральный тип	4,1	3,1	5,0
Килевидная деформация грудной клетки, костальный тип	7,1	4,8	9,4
Нарушения осанки и сколиозы шейного и грудного отделов позвоночника	68,7	56,7	80,7**
Сколиоз поясничного и грудо-поясничного отделов позвоночника	3,7	3,4	3,9
Поперечное плоскостопие	58,8	54,1	63,4
Продольное плоскостопие			
1 степени	32,2	33,2	29,7
2 степени	10,2	10,0	10,4
3 степени	1,6	2,2	0,9

Примечание: * – достоверность различий $p < 0,05$, ** – достоверность различий $p < 0,001$