

Таблица 14

**Клинические синдромы и жалобы детей и подростков с
дисплазией соединительной ткани и без таковой**

Клинические проявления	1 группа (n=508) с ДСТ	2 группа (n=442) без ДСТ
Астенический синдром	66,0% (n=335)	33,0% (n=146)***
Косметический синдром	49,0% (n=249)	7,7% (n=34)***
Ипохондрический синдром	11,0% (n=56)	6,1% (n=27)**
Частые головные боли	9,5% (n=48)	7,5% (n=33)
Кардиалгический синдром	37,0% (n=188)	23,1% (n=102)*
Аритмический синдром (перебои в работе сердца или сердцебиения)	12,2% (n=62)	5,0% (n=22)**
Пресинкопальные состояния и синкопальные состояния в анамнезе	3,9% (n=20)	2,0% (n=9)*
Гипервентиляционный синдром	21,3% (n=108)	5,2% (n=23)**
Частые респираторные заболевания (ежеквартально)	16,9% (n=86)	12,9% (n=57)
Хронические ЛОР-заболевания	12,2% (n=62)	7,7% (n=34)*
Частый герпес	7,3% (n=37)	10,6% (n=47)
Геморрагический синдром (легкость кровозлияний на коже, кровотечения из десен, ректальные, носовые)	4,7% (n=24)	2,9% (n=13)
Эпизоды дорсалгий в анамнезе	45,1% (n=229)	39,4% (n=174)
- из них цервикалгии	17,9% (n=91)	15,2% (n=67)
- из них торакалгии	10,4% (n=53)	7,1% (n=30)
- из них люмбагии	16,7% (n=85)	17,4% (n=77)
Рецидивирующие полиартралгии	9,1% (n=46)	6,1% (n=27)
Боли, утомляемость стоп	7,3% (n=37)	2,9% (n=13)
Нарушение сна	5,7% (n=29)	2,9% (n=13)
Снижение аппетита	7,3% (n=37)	7,7% (n=34)
ИМТ <17	31,3% (n=159)	0,2% (n=1)
Артериальная гипотензия (АД 100- 80/70-40 мм.рт.ст)	49,0% (n=249)	16,5% (n=73)*
Плохая успеваемость в школе	14,8% (n=75)	10,6% (n=47)*
Гастралгический синдром (повторяющиеся боли в животе различной локализации)	20,7% (n=105)	12,0% (n=53)*
Синдром диспепсии	19,3% (n=98)	15,4% (n=68)
Средняя частота обращений к врачам за год по всем поводам	5,9±1,8	3,2±2,1

Примечание: * – $p < 0,05$, ** – $p < 0,01$, *** – $p < 0,001$ – статистическая значимость различий по критерию χ^2 .