

**Малые и большие аномалии развития, формирующие
косметический синдром у школьников с ДСТ**

№ п/п	Признаки	Частота в процентах
1.	Второй палец стопы больше первого	52,0
2.	Сандалевидная щель (расстояние между 1 и 2 пальцами стопы равно или больше ширины 2-го пальца)	52,0
3.	Неправильный рост зубов	41,0
4.	Клиндактилия (искривление одного пальца кисти)	26,0
5.	Третий тип мочки уха (приросшая мочка уха)	22,0
6.	Неправильный прикус	22,0
7.	Низкий рост волос на лбу и шее	19,0
8.	Дополнительные зубы	14,5
9.	Гетерохромия радужной оболочки глаз	11,5
10.	Короткая уздечка языка	10,5
11.	Низко расположенные уши	8,0
12.	Диастема (широкая щель между центральными резцами)	8,0
13.	Уздечка верхней губы	8,0
14.	Деформированные ушные раковины	7,5
15.	Гипотелоризм (близко расположенные глаза)	7,0
16.	Большие торчащие уши	7,0
17.	Эпикант (кожная складка в медиальном углу глаза, прикрывающая слезное мяско)	6,5
18.	Экзофтальм	6,5
19.	Энофтальм	6,0
20.	Гипертелоризм глаз (увеличение расстояния между внутренними краями глазниц)	5,0
21.	"Мятые" ушные раковины	5,0
22.	Гипертелоризм сосков	4,5
23.	Камптодактилия (контрактура проксимальных межфаланговых суставов)	2,0
24.	Брахидактилия	1,5
25.	Политемия (количество сосков больше двух)	1,0

Синдром гипермобильности суставов. Достаточно часто среди подростков с ДСТ отмечают жалобы на боли в суставах – 9,1 % против 6,1 % у подростков без ДСТ. Обычно боли провоцируются простудными заболеваниями, интоксикациями, метеоусловиями, изменениями гормонального состояния (менструация). Гипермобильность суставов – симптом, которому не придается