

отдельных зубов, сверхкомплектные зубы, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, невосстановленные дефекты зубных рядов по разным причинам. Среди причин потери зубов наиболее частыми являются – глубокий кариес, а также отсутствие зачатков постоянных зубов. Обращает внимание, что подростки с изменениями зубочелюстного аппарата предъявляют, в основном, косметические жалобы.

По нашим наблюдениям, наибольшие сложности в курации представляют пациенты с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, так как эта патология находится вне сферы стоматологов. Несвоевременное выявление или невнимание к «причудливым» жалобам больного приводит к тому, что в возрасте 35-40 лет определяются уже «запущенные» случаи остеоартрозов височно-нижнечелюстных суставов, когда рот у пациента не открывается более чем на 2,5–3 см. Эти случаи не подлежат даже оперативному лечению, и пациент на всю жизнь остается с неразрешимыми проблемами. В 2 случаях направления на оперативное лечение в Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, пациенты не были оперированы, так как прогноз операций «очень сомнителен».

Таблица 24

Изменения зубо-челюстного аппарата у подростков с ДСТ (n=50) и без таковой (n=50)

Изменения зубо-челюстного аппарата	Подростки без ДСТ		Подростки с ДСТ	
	абсол.кол	процент	абсол.кол	процент
Аномалии слизистой	2	4,0	3	6,0
Готическое небо	5	10,0	14	28,0*
Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава	2	4,0	8	16,0*
Аномалии положения отдельных зубов, сверхкомплектные зубы	5	10,0	13	26,0*
Аномалии прикуса	18	36,0	23	46,0
Прогения	0	0	1	2,0
Прогнатия	1	2,0	1	2,0
Глубокий прикус	2	4,0	6	12,0
Глубокое резцовое перекрытие	9	18,0	5	36,0*
Невосстановленные дефекты зубных рядов (отсутствие постоянных зубов)	8	16,0	17	34,0*

Примечание: * – $p < 0,05$ (по критерию χ -квадрат)