

Сравнительная частота фенотипических признаков дисплазии соединительной ткани у лиц среднего и пожилого возраста с оценкой их прироста

Признак	Частота, в процентах		Прирост частоты выявляемости признаков ДСТ
	Пациенты среднего возраста (n=100)	Пожилые пациенты (n=100)	
Индекс Варги ≤ 1.7	30,0	37,0	23,33
Долихостеномелия	5,0	5,0	0
Астеническая грудная клетка	20,0	20,0	0
Воронкообразная деформация грудной клетки 1 степени	3,0	2,0	-33,33
Килевидная деформация грудной клетки манубриостерального типа	3,0	3,0	0
Сколиоз шейного и грудного отделов позвоночника 1-2 ст.	38,0	58,0	52,63
Сколиоз грудного и поясничного отделов позвоночника 1-2 ст.	15,0	15,0	0
Отсутствие поясничного лордоза	13,0	15,0	15,38
Поясничный гиперлордоз	30,0	32,0	6,67
Гиперкифоз (грудной)	20,0	43,0*	115,00
Мобильность суставов 4 и более у женщин, 2 и более у мужчин	8,0	5,0	-37,50
Готическое небо	10,0	10,0	0
Вентральные грыжи	15,0	47,0***	213,33
Диастаз прямых мышц живота	3,0	12,0	300,00
О- и Х-образные ноги	7,5	5,0	-33,33
Поперечное плоскостопие	7,0	12,0	71,43
Продольное плоскостопие 1-2 степени	17,0	20,0	17,65
Варикозное расширение вен с хронической венозной недостаточностью 1-3 степени	35,0	40,0	14,28
Hallux valgus	20,0	45,0**	125,00
Среднее значение прироста			44,77

Примечание: * – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$ (статистическая значимость различий по критерию χ^2)