

**Диагностические коэффициенты и коэффициенты информативности
признаков ДСТ у лиц среднего и пожилого возраста**

Признак	ДК	КИ
Сколиоз позвоночника с юности	13,53	2,46
Индекс Варги ≤ 1.7	5,83	1,54
Сколиоз шейно-грудного отдела	4,71	1,49
Продольное плоскостопие с юности	1,80	1,22
Поперечное плоскостопие с юности	1,80	1,22
Пролапс митрального клапана	9,24	1,16
Гипермобильность суставов	7,87	0,98
Миопия	5,74	0,80
Астеническая грудная клетка	5,95	0,74
Продольное плоскостопие	6,25	0,68
Поперечное плоскостопие	6,70	0,63
Воронкообразная деформация грудной клетки 1 степени	9,79	0,47
Сколиоз позвоночника П степени	13,36	0,31
Гастроптоз	7,51	0,29
Нефроптоз	4,49	0,28
Высокое небо	4,49	0,21
Килевидная деформация грудной клетки	6,78	0,16
Вентральные грыжи	1,99	0,16
Долихостеномелия (марфаноидность)	4,47	0,14
Варикозное расширение вен нижних конечностей	1,48	0,10
Гиперкифоз грудного отдела позвоночника	1,48	0,07
Аномально расположенные хорды	1,49	0,01

При эпидемиологическом анализе 200 пациентов среднего и пожилого возраста признаки ДСТ выявлены у 84 пациентов (42,0 %). Все обследованные разделены на 2 группы: 1 группа – с диагностированной ДСТ, не дифференцируемой ни в один из известных соединительнотканых синдромов, (n=84) и 2 группа – без ДСТ (n=116).

Частота выявления ДСТ у лиц среднего и пожилого возраста меньше по сравнению с подростками и молодыми лицами: 42,0 % против 53,5 % ($\chi^2=8,254$, $p=0,004$). По-видимому, это связано не только со схожестью фенотипических проявлений ДСТ и инволюционных процессов, но и с более высокой летальностью лиц с ДСТ.