

8. Самоубийство на фоне некорригированной депрессии
9. Алкоголизм, отравление суррогатом
10. Автомобильная травма

Причины летальных исходов в пожилом возрасте от 60 до 80 лет были следующие.

1. Генерализованный туберкулёз с лептоменингитом
2. Фиброзно-кавернозный туберкулёз с легочно-сердечной недостаточностью
3. Буллёзная эмфизема легких, спонтанный пневмоторакс
4. Ишемическая болезнь сердца с сердечной недостаточностью
5. Разрыв аневризмы грудного отдела аорты (мезаортит неустановленной этиологии)
6. Гипертоническая болезнь с первично-сморщенной почкой и уремией
7. Гнойный отит, осложнённый менингитом.
8. Инфаркт миокарда с кардиогенным шоком
9. Расширение корня аорты при синдроме Марфана с недостаточностью аортального клапана
10. Рак поджелудочной железы
11. Бытовая травма

Таблица 29

Сводные данные причин летальных исходов у лиц с ДСТ с учетом основных нозологических групп

Причины по нозологическим группам	Абсолютное количество	Процент
Патология легких и туберкулез	5	21,7
Диспластическая патология сосудов и клапанов сердца	5	21,7
Алкоголизм, суициды, травмы	4	17,4
Гипертоническая и атеросклеротическая болезни сердца	3	13,0
Онкозаболевания	2	8,7
Инфекционная патология (инфекционный эндокардит, гнойный отит)	2	8,7
Аутоиммунная патология (системная красная волчанка)	1	4,4
Послеоперационные осложнения при кифосколиотической болезни	1	4,4
Итого:	23	100,0

Анализ летальных исходов лиц с ДСТ в различных возрастах выявил большой процент смертей, связанных с туберкулёзом (4 из 23,