

водяную баню в банке или кастрюле и доводили до жидкого состояния. На тарелку или поднос укладывали кусок клеенки и на нее выливали жидкий озокерит ровным слоем. Озокерит застывал при температуре +37–38°C, становился приятно теплым. Вместе с клеенкой укладывался на больное место и укутывался платком или одеялом на 20 минут (у детей первого полугодия жизни). Первая аппликация делалась на 5–10 минут для определения индивидуальной переносимости. Детям второго полугодия жизни постепенно увеличивали время воздействия озокеритовой аппликации до 30 минут, более старшим – до 40 минут. После снятия озокерита кожа протиралась досуха и ребенок тепло укутывался.

Приложение 6

Широкое пеленание

Широкое пеленание назначается всем детям с подозрением на врожденную патологию тазобедренного сустава и при подтверждении диагноза в первые 2–3 месяца жизни. Одна из пеленок складывается треугольником, основание треугольника подкладывается под ребенка до уровня поясницы. Вторая пеленка (лучше фланелевая) складывается в 8 раз и укладывается между разведенными ножками ребенка на 2–3 см ниже пупка. Угол первой пеленки сгибается на живот и фиксируется двумя боковыми углами, удерживая вторую пеленку между ножками ребенка, а ножки ребенка в положении отведения. Для этой же цели могут быть использованы отводящие трусики.

Приложение 7

Схема назначения антибиотиков для профилактики инфекционного эндокардита у детей с миксоматозно изменёнными створками митрального клапана и митральной регургитацией

Амоксициллин внутрь (по 0,06 на кг массы тела) за 1 час до вмешательства и половинная доза от первоначальной внутрь через 6 часов после первого приёма.

или

Ампициллин в/м (в/в) 200 мг/кг массы тела за 30 минут до вмешательства, затем половинную дозу от первоначальной в/м (в/в) через 6 часов после первого введения.

При непереносимости пенициллинового ряда:

Эритромицин-этилсукцинат в/в 20 мг/кг массы тела, затем половину от первоначальной дозы через 6 часов после первого введения.

Эритромицин-стеарат 600 мг/кг внутрь за 2 часа до вмешательства; затем половину от первоначальной дозы через 6 часов после первого приёма.

Ванкомицин 20 мг/кг массы тела в/в, инфузия должна проводиться в течение 60 мин и заканчиваться за 30 минут до вмешательства, однократно.