

- Мятного масла по 1 мл
 Этилового спирта 95 % 5 мл
 Смешать. Выдать. Обозначить. По 1-5 капель на стакан воды для полоскания.
- 38.Возьми: Эвкалиптового масла 0,5
 Этилового спирта 95% 5 мл
 Бензойной кислоты 1,0
 Очищенной воды до 250 мл
 Смешай. Выдай. Обозначь. 1 столовая ложка на стакан воды для полоскания полости рта.
- 39.Возьми: Эвкалиптового масла 10,0
 Ментола 1,0
 Смешай. Выдай. Обозначь. Для аэрозольного орошения .15-20 капель на стакан воды.
- 40.Возьми: Мятной воды 20 мл
 Борной кислоты 5,0
 Очищенной воды 220 мл
 Смешать. Выдать. Обозначить. 1 столовая ложка на стакан воды для полоскания полости рта при неприятном запахе.
- 41.Возьми: Масла перечной мяты 5 мл
 Этилового спирта 95% 20 мл
 Смешай. Выдай. Обозначь. По 10 капель на стакан Воды для полоскания полости рта.
- 42.Возьми: Масла перечной мяты 5 мл
 Глицерина
 Этилового спирта 95% по 30 мл
 Смешать. Выдать. Обозначить. По 1 чайной ложке на ½ стакана воды для полоскания полости рта при сухости.

Антибиотики, аминогликозиды

- 43.Возьми: Раствора сульфата гентамицина 4% 2 мл
 Выдай такие дозы числом 10 в ампулах.
 Обозначь. Вводить в мышцу из расчета 0,8 мг/кг каждые 8 часов в течение 8-10 дней.

Антибиотики – макролиды

- 44.Возьми: Таблетки эритромицина 0,25 числом 10
 Выдай. Обозначь. По 1 таблетке 4 раза в день за 1-1,5 часа до еды.
- 45.Возьми: Мази эритромицина 1% 10,0
 Выдай. Обозначь. Для смазывания губ и кожи вокруг рта.

Производные нитрофурана

46. Возьми: Раствора фурацилина 0,02% 500 мл
 Выдай. Обозначь. Для полоскания полости рта.
47. Возьми: Таблетки фурадонина 0,05 числом 20
 Выдать. Обозначить. Для приготовления пасты и суспензий.
48. Возьми: Фуразолидона
 Новокаина по 0,25