

Таблица 1

Шкала комы Глазго (Teasdale G., Lennett B., 1974)

**Функциональное исследование
баллы**

1 . Открывание глаз:

- | | |
|----------------------|---|
| - спонтанное | 4 |
| - на речевую команду | 3 |
| - на боль | 2 |
| - ответ отсутствует | 1 |

2. Двигательный ответ:

- | | |
|--|---|
| - на речевую команду | 6 |
| -на болевое раздражение с локализацией боли | 5 |
| - отдергивание конечности со сгибанием | 4 |
| - патологическое сгибание конечности | 3 |
| - разгибание (по типу десеребрационной ригидности) | 2 |
| - отсутствие ответа | 1 |

3. Речевые реакции:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| - ориентированность и разговор | 5 |
| - дезориентированность и разговор | 4 |
| - бессвязные слова | 3 |
| - непонятные звуки | 2 |
| - отсутствие ответа | 1 |
-

Пределы колебаний - 3 -15 баллов. Примерное соответствие характеристик по шкале Глазго уровню сознания:

- 15 ясное сознание;
- 14 - 13 – оглушение поверхностное;
- 12 - 10 – оглушение глубокое;
- 9 - 8 - сопор;
- 7 - 6 - умеренная кома;
- 5 - 4 – глубокая кома;
- 3 – терминальная кома (смерть мозга).