

Стадия I. Больные эйфоричны, говорливы, но речь прерывистая; жалуются на бессонницу. Кожные покровы горячие, гиперемированы. Отмечается повышенное потоотделение. Артериальное и центральное венозное давление повышено. Тахикардия.

Стадия II. Больные возбуждены, иногда беспричинно веселы, не отдают себе отчета в тяжести своего состояния. Кожные покровы синюшно-багровые. Обильное потоотделение, гиперсаливация и бронхиальная гиперсекреция. Выраженная артериальная и венозная гипертензия, стойкая тахикардия.

Стадия III. Ацидотическая кома. Сознание постепенно утрачивается, больные «успокаиваются», впадают в карбонаркоз. Зрачки, вначале суженные, быстро расширяются до максимума. Арефлексия. Кожные покровы цианотичны. Артериальное давление снижается, пульс аритмичный. Наступает смерть.

Основные вентиляционные и газовые нарушения при различных формах ОДН.

Форма ОДН	Частота дыхания	Дыхательный объем	Минутный объем дыхания	Жизненная емкость легких	PaO ₂	PaCO ₂
Центрогенная	Тахипноэ, брадипноэ, аритмия	↑ или ↓	↑	↓ или не проверена	↓	↓
Нервно-мышечная	Норма или тахипноэ	↓↓	↓	↓↓	норма или ↓	↑↑
Торако-диафрагмальная	Тахипноэ	↓↓	↓↓	↓↓	норма или ↓	↑↑
Бронхолегочная обструктивная	Вначале снижена	вначале ↑	↑	вначале норма	↓	↓
Бронхолегочная рестриктивная	Тахипноэ	↓	↑	↓↓	↓	↑
Нарушения перфузии легких	Резко увеличена	↑	↑↑	↓	↓↓	↑