

ХРОНИЧЕСКИЕ ГЕПАТИТЫ

Хронический гепатит (ХГ) — хроническое воспаление в печени, продолжающееся без тенденции к улучшению на протяжении не менее 6 месяцев.

ЭТИОЛОГИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТОВ отражена в современной классификации (Лос-Анджелес, 1994), см. выше.

ДИАГНОЗ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА должен отражать, кроме этиологического фактора, клиническую стадию процесса, тяжесть гистологических изменений (некровоспалительная активность) на основании индекса гистологической активности - ИГА (таблицы 1 и 2), гистологическую стадию (степень фиброза) – таблица 3, для вирусных гепатитов – выявленные маркёры гепатита и фазу развития вируса (интеграция или репликация).

Таблица 1

ИНДЕКС ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ (ИГА)

№ п/п	Морфологические компоненты	Баллы
1.	Перипортальные некрозы (в том числе мостовидные некрозы)	0 - 10
2.	Внутридольковые фокальные некрозы и дистрофия гепатоцитов	0 - 4
3.	Воспалительный инфильтрат в портальных трактах	0 – 4

Тяжесть гистологических изменений оценивается по индексу гистологической активности Knodell (ИГА), см. табл. 1. Корреляция степени тяжести ХГ с ИГА отражена в таблице 2. Гистологическая стадия ХГ отражает длительность его течения и характеризуется степенью фиброза.

На основании результатов тонкоигольчатой пункционной биопсии печени патоморфолог даёт заключение о некровоспалительной активности (ИГА) и степени фиброза (цирроза) печени, причём гистологические изменения в печени при различных этиологических агентах сходны. Применение метода флюоресцирующих антител позволяет определять антигены вирусов в гепатоцитах при биопсии или аутопсии печени.

Таблица 2

СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА СООТВЕТСТВИИ С ИНДЕКСОМ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

ИГА (в баллах)	Степень тяжести хронического гепатита
1-3	Минимальная
4-8	Легкая
9-12	Средняя
13-18	Тяжелая