

ЛЕЧЕНИЕ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ

Схема 2

ПРЕПАРАТЫ, ПОДАВЛЯЮЩИЕ РЕПЛИКАЦИЮ ВИРУСА ГЕПАТИТА В

[Клиническая фармакология и терапия, 1999, 8 (1)]

НУКЛЕОЗИДНЫЕ (преимущества - приём внутрь, нетоксичны)

АНАЛОГИ ПУРИНОВ

1. Пенцикловир (фамцикловир)
Фамвир по 500мг 3 раза /сутки
2. Ганцикловир (Цимевен, ROCHE)
3. Рибавирин (Виразол)
4. Видарабин
5. Аденозин арабинозид
монофосфат (ара-АМФ)

АНАЛОГИ ПИРИМИДИНОВ

1. Ламивудин - ЗТС, Эпивир
по 150 мг, Зеффикс 100мг.

НЕНУКЛЕОЗИДНЫЕ

ИНТЕРФЕРОНЫ

в/м 5 млн.ед 3 раза в нед 6 мес.
или 10 млн. ед 3 раза в нед 3 мес

1. Альфа интерферон
Альфаферон, ALFA WASSERMANN
2. Альфа-2а интерферон
Роферон-А, ROCHE
3. Альфа-2в интерферон
Интрон-А, SCHERING-PLOUGH
Виферон, "БКИ"
Реальдирон, BIOFA
4. Альфа-n1 интерферон
Веллферон, GLAXOWELLCOME
5. Бета-интерферон
Ребиф, SERONO
6. Индукторы интерферона
Циклоферон, ПОЛИСАН
7. Гамма-интерферон

ЦИТОКИНЫ

1. Тимозин-альфа
0,9мг/м² п/к 2 раза в
неделю 6 месяцев
2. Фактор некроза опухоли
3. Интерлейкин -2