

и заращении зрачка и
развитии вторичной глаукомы;

- содержимое передней камеры может быть прозрачным или мутным, гипопион (гной) или гифема (кровь);

- состояние радужной оболочки: выраженность или ступенчатость рисунка, цвет (серая, бурая, желтоватая, зеленоватая, красноватая), сравнение с другим глазом. Наличие в радужной оболочке расширенных или вновь образованных сосудов (рубхоз), сращение с роговицей (передние синехии) и хрусталиком (задние синехии);

- состояние зрачка: его размеры (узкий, широкий), реакция на свет (живая, вялая), форма (круглая или неправильная);

- состояние передней капсулы хрусталика: наличие глыбок бурого цвета, серых или желтоватых крошкообразных, или пленчатых отложений.

д) Осмотр в проходящем свете - рефлекс с глазного дна:

1. розовый;
2. тускло-розовый;
3. неравномерно-розовый;
4. темного цвета.

е) Офтальмоскопия.

ж) Дополнительные методы исследования:

1. Лабораторная диагностика.
2. Определение неспецифического иммунитета.
3. Состояние глазного давления пальпаторно и тонометрия: нормальное; пониженное; повышенное.

4. При необходимости диафаноскопия, эхоофтальмография, В-сканирование.